

Szukaj

Strona główna

[Żyłna choroba zakrzepowo-zatorowa](#)[Nadkrzepliwość](#)[Przewlekła niewydolność żylna](#)[Sytuacje szczególne](#)[Wywiady](#)[Zapytaj lekarzy](#)

Portal lekarzy >>

Zakrzepica i żyłaki

- Profilaktyka zakrzepicy
- Wszystko o zakrzepicy
- Zatorowość płucna
- Nadkrzepliwość
- Żyłaki
- Sytuacje szczególne

Wszystkie serwisy

- Baza leków
- Ciąży
- Cukrzyca
- Dieta
- Pediatria
- Choroby alergiczne
 - Infekcje
 - Grypa i przeziębienie
- Choroby serca i naczyń krwionośnych
 - Choroba wieńcowa
 - Nadciśnienie tętnicze
- Choroby układu oddechowego
 - Astma
 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc
- Choroby układu pokarmowego
- Choroby nerek i dróg moczowych
- Psychiatria
- Choroby reumatyczne
- Zdrowie w podróży



Sondaż MP: 79% lekarzy przepisuje recepty pełnopłatne zamiast refundowanych

Wyniki badania pokazują, że zmiany zasad refundacji uderzyły w pacjentów. Na lekarzy nałożono surowe kary, ale przede wszystkim wielkiej grupie chorych odebrano należną prawem refundację.

Ekspert przestrzega przed zabiegami „fish pedicure”

Pacjentom z zaburzeniami krzepnięcia lub w trakcie leczenia przeciwzakrzepowego nie zaleca się stosowania zabiegów „fish pedicure”.



Powstaje Centrum Diagnostyki i Leczenia Żyłnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej

W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie zakupiono i zainstalowano m.in. unikatowy nowoczesny cyfrowy angiograf, który umożliwi prowadzenie zaawansowanych badań naukowych dotyczących patofizjologii krążenia płucnego. Uruchomienie nowoczesnego ośrodka poprawi opiekę nad grupą chorych z zatorowością płucną.



Antykoncepcja hormonalna a zakrzepica żylna

Zakrzepica może wystąpić w każdym momencie stosowania antykoncepcji, ale ryzyko jest największe w ciągu pierwszego roku, a zwyższa podczas trzech pierwszych miesięcy stosowania.



Samokontrola INR

Ocenę skuteczności leczenia lekami przeciwkrzepliwymi wykonuje się przeważnie w krwi żyłnej pobranej z żyły przedramienia lub dołu łokciowego i oznaczenia tzw. wskaźnika INR.



Jakie produkty żywnościowe mają wpływ na wzrost wskaźnika INR?

Nagła i znaczna zmiana w spożyciu witaminy K może spowodować potencjalnie niebezpieczne zmiany INR, dlatego należy utrzymywać stałą dietę.



Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych

W zależności od miejsca, w którym powstaje zakrzep, wyróżniamy zakrzepicę dystalną, proksymalną i obrzęk bolesny. Często symetryczne obrzęki łydek, nasilające się pod koniec dnia występują również w żyłkach, niewydolności krążenia, czy nadciśnieniu.



Co to jest zakrzepica?

Zakrzepica najczęściej rozpoczyna się w żyłach znajdujących się w mięśniach łydek i stamiad, przechodząc do coraz większych żył, może wędrować ku górze do żył znajdujących się na udzie, a niekiedy nawet w miednicy i jamie brzusznej.



Sprawdź swoje ryzyko zakrzepicy

Jesteś w ciąży lub niedawno urodziłaś dziecko? Cierpisz na niewydolność krążenia? Masz znaczną nadwagę? Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka.



Jak prawidłowo stosować wyroby uciskowe

W profilaktyce żyłaków oraz po przebytej zakrzepicy, o ile nie ma przeciwwskazań, zaleca się stosowanie podkolanówek lub pończoch uciskowych.



Zaloguj się

Zarejestruj się

Wywiady



Człowiek dotknięty przypadkiem
Z pieśniarzem Leszkiem Wójtowiczem rozmawia Justyna Tomaska



Uciec przed zakrzepicą
Z prof. Jackiem Musiałem, Kierownikiem II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM, rozmawia dr med. Marzena Forlow

Poradniki

• **Poradnik dla osób przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwie**
Ważne praktyczne informacje dla pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

• **Poradnik dla osób leczonych heparyną drobnocząsteczkową**
Preparaty heparyny drobnocząsteczkowej wstrzykuje się podskórnie zgodnie z zaleceniami lekarza raz lub dwa razy dziennie. Zobacz, jak prawidłowo wykonywać zastrzyki.

Zobacz, co czyta Twój lekarz

• **Samokontrola INR a kontrola standardowa podczas leczenia doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi**
Samodzielne monitorowanie INR przynosi największe korzyści starszym chorym z kilkoma chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko zakrzepowo-zatorowe i krwotoczne oraz przyjmującym wiele leków.

• **Żyłna choroba zakrzepowo-zatorowa – postępy 2010/2011**
Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska omawia wybrane doniesienia z 2010 i początku 2011 roku dotyczące profilaktyki i leczenia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

• **Antyvitaminy K w świetle wytycznych ESC 2007 i ACCP 2008**
Antyvitaminy K są stosowane od ponad 60 lat w profilaktyce i leczeniu powikłań zakrzepowo-zatorowych, zarówno żylnych, jak i tętniczych.

Lekarze odpowiadają na pytania

• **Czy leki przeciwzakrzepowe stosuje się przy napadowym migotaniu przedsionków?**
Miewam czasami napady (raz na rok, czasami rzadziej). Po ostatnim ataku (umiarowanie farmakologiczne po ok. 10 h) przepisano mi leki przeciwzakrzepowe.

• **Leczenie podskórnymi zastrzykami heparyny drobnocząsteczkowej – powikłania**
Przy robieniu zastrzyków z heparyny u mojego męża pojawił się rozlany krwiak i zrost wielkości piłeczki do tenisa stołowego, czy jest to niebezpieczne dla życia i co można z tym zrobić?

• **Czy stosowanie antykoncepcji hormonalnej zwiększa ryzyko zakrzepicy?**
Czy stosowanie antykoncepcji hormonalnej w postaci tabletek antykoncepcyjnych mocno zwiększa ryzyko powstania zakrzepicy? Czy mogę ją stosować mając 35 lat i paląc około 7 papierosów dziennie?

Gdzie się leczy?

Lekarz specjalista

Angiolog

wybierz miasto

Szukaj

Szpitale, przychodnie, gabinety

Angiologia

wybierz miasto

Szukaj

alergia pokarmowa | alergiczne zapalenie spojówek | alergiczny nieżyt nosa | atopowe zapalenie skóry | astma | baza leków | bezsenność | choroba refluksowa przełyku | choroba wieńcowa | choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy | ciąża | cukrzyca | depresja | dieta | grypa | hemoroidy | kamica nerkowa | kamica żółciowa | karmienie piersią | nadciśnienie tętnicze | nietrzymanie moczu | osteoporoza | ostre zapalenie trzustki | POChP | pokrzywka | przeziębienie | szczepienia ochronne | zakażenia układu moczowego | zakrzepica | zapalenia żołądka | zapalenie oskrzeli | zapalenie płuc | zawał serca

medycyna praktyczna

Redakcja | O nas



Copyright © 1996 - 2012 Medycyna Praktyczna