

ozn. orób piec. J.	porz.	
Nr. inw.	1624	

RZYPADEK

UKLEJA SZYI MACICY

USUNIĘTEGO PODCZAS CIĄŻY

opowiedział

Prof. Dr. A. MARS

na posiedzeniu Tow. ginek. krak. w dniu 26 października 1897 r.

DAR
Prof. Dra J. Zabrzynskiego



W KRAKOWIE,

DRUKARNIA UNIwersytetu Jagiellońskiego

pod zarządem Józefa Filipowskiego.

1898.

PRZYPADEK

UKLEJA SZYI MACICY

USUNIĘTEGO PODCZAS CIĄŻY

opowiedział

Prof. Dr. A. MARS

na posiedzeniu Tow. ginek. krak. w dniu 26 października 1897 r.



Dar Prof. dra J. Zubrzyckiego



W KRAKOWIE,

DRUKARNIA UNIwersYTETU Jagiellońskiego

pod zarządem Józefa Filipowskiego.

1898.

WP M3631 p 1898

Osobne odbicie z „Rocznika Tow. ginekolog. za rok 1897.

Z-138183

2023

408

Przypadek ukleja szyi macicy usuniętego podczas ciąży

opowiedział

Prof. Dr. A. Mars

na posiedzeniu Tow. ginek. krak. w dniu 26 października 1897 r.

Przypadek odnośny dotyczy wieloródki, która już podczas 5-tej ciąży okazywała podśluzowego włókniaka wielkości orzecha leszczynowego, usadowionego w ścianie szyi macicy po stronie lewej. Poród i połóg przebiegał wówczas prawidłowo, a po zwinięciu się macicy można było zauważyć, że włókniak wypukła się więcej ze ściany macicy pod błonę śluzową, aniżeli to podczas ciąży miało miejsce. Radzono guzek usunąć, pacjentka się jednak na to nie zgodziła, gdyż żadnych objawów nie spostrzegala.

W kilka miesięcy zaszła w ciążę ponownie. W 6-tym miesiącu księżycowym ciąży zgłosiła się znów, wielce zaniepokojona czerwonymi plamami, które w ciągu obecnej ciąży od czasu do czasu się pojawiają.

Badanie wykazało, że włókniak powiększył się do wielkości orzecha włoskiego, że wytworzył się uklej usadowiony na bardzo grubej szypule, który sterczy przez ujście zewnętrzne macicy ku pochwie. Radzono usunięcie ukleja; gdy atoli rodzina chorej się obawiała, że zabieg może wywołać

przedwczesną czynność porodową, odbyła się narada lekarska w celu rozstrzygnięcia pytania: czy lepiej usunąć ukleja zaraz, czy też dopiero na końcu ciąży? Zgodzono się na zdanie ostatnie.

Po podwiązaniu szypuły odcięto ukleja. Zabieg nie wywołał żadnych objawów ze strony ciąży; — po 8-miu dniach odpadła resztką szypuły wraz z podwiązką. Poród i połóg na czasie prawidłowy.

Uzyskany preparat okazuje włókniaka podśluzowego (*fibroma prolapsum*) wielkości orzecha włoskiego. Na szczycie guza widać owrzodzenie wielkości 20-sto halercówki, o dnie nierównem, pokrytem nekrotycznymi strzępami. W miejscu owrzodzenia brak błony śluzowej, a dno owrzodzenia stanowi odsłonięta powierzchnia włókniaka, który prawdopodobnie tą drogą byłby był w przyszłości dobrowolnie wykluczony. (Podczas badania palcem wrzodu tego czuć nie było, a wziernika do badania nie używano).

Naturalnem jest, że owrzodzenie takie podczas porodu mogłoby być źródłem zakażenia i dlatego w podobnym przypadku jak najspiesniejsze usunięcie ukleja uważać należy za wskazane.

